基于肉鸡性别的鸡汤挥发性物质主成分分析

Principal component analysis of volatile compounds in chicken soup based on the gender of broiler

张艳¹ 夏杨毅^{1,2} 何翠¹ 周涛¹

ZHANG Yan¹ XIA Yang-yi^{1,2} HE Cui¹ ZHOU Tao¹

(1. 西南大学食品科学学院, 重庆 400715; 2. 重庆市特色食品工程技术研究中心, 重庆 400715)

(1. College of Food Science, Southwest University, Chongqing 400715, China;

2. Chongqing Special Food Programme and Technology Research Center, Chongqing 400715, China)

摘要: 利用固相微萃取—气相色谱—质谱 (SPME—GC—MS) 联用内标法, 研究基于肉鸡性别差异的传统鸡汤挥发性物质, 并分别进行主成分分析。结果显示: 两种鸡汤共检测出挥发性物质 78 种, 其中母鸡肉汤和公鸡肉汤分别为 76, 67 种, 含量分别为 1 369.84, 1 029.61 $\mu\text{g}/100\text{ mL}$, 主要为醛类、酮类、醇类、烷烃类、酸类和酯类, 两者共同含有的挥发性物质为 65 种。母鸡肉汤和公鸡肉汤中反式-2-己烯醛、(E,E)-2,4-庚二烯醛、十三醛、2-庚酮、正己醇等 13 种风味物质的含量差异显著 ($P < 0.05$)。两种鸡汤经主成分分析都得到两种主成分物质, 且累计贡献率达 100%, 但种类和含量差别较大。

关键词: 母鸡; 公鸡; 挥发性物质; 主成分分析

Abstract: The volatile compounds of traditional chicken soup based on the gender of broiler were identified using solid phase microextraction coupled with gas chromatography-mass spectrometry (SPME—GC—MS) and were further quantified based on internal standard analysis, and the main flavor components were analyzed by principal component analysis, respectively. Results showed that: 78 kinds of volatile compounds were detected in chicken soup. 76 and 67 volatile compounds were detected from hen broth and rooster broth, and were 1 369.84 $\mu\text{g}/100\text{ mL}$ and 1 029.61 $\mu\text{g}/100\text{ mL}$, respectively. The main volatile flavor compounds in both chicken soup were aldehydes, ketones, alcohols, hydrocarbons, acids and esters. 65 volatile substances were in both samples. Trans-2-Hexenal, Trans, trans-2, 4-Heptadienal, Tridecanal, 2-Heptanone and Hexyl alcohol total of 13 volatile substances have a Significant difference. They both have two main components and the cumulative contribution rate can reach

100%. But, the main volatile compounds of them have a large difference in type and content.

Keywords: hen; rooster; volatile substances; principal component analysis

鸡汤以其诱人汤色、鲜香风味和滋补作用而深受广大消费者喜爱^[1-2]。鸡汤风味是食用品质的重要指标之一, 受鸡肉风味前体物质在加热过程中的美拉德反应^[3]、脂质氧化^[4]、巯胺素降解^[5]等产生的挥发性物质影响, 鸡汤挥发性物质组成与鸡汤加热熬制工艺^[6]、肉鸡品种^[7]等有关。

研究^[8]表明: 性别是影响肉类风味的重要因素之一。陈康等^[9]研究发现不同性别伊拉兔肉的挥发性风味物质存在显著差异, 母兔肉挥发性风味物质明显比公兔肉丰富; Gorriaz C 等^[10]研究表明母牛肉较公牛肉风味好, 公牛的肉具有很强的血腥味; 袁华根等^[11]研究表明公鸡肉的挥发性风味强度略好于母鸡。但肉鸡性别对鸡汤挥发性物质的影响研究仍属空白。因此, 本研究拟以传统鸡汤为研究对象, 利用顶空固相微萃取—气相色谱—质谱联用 (SPME—GC—MS) 内标法测定母鸡肉汤和公鸡肉汤的挥发性物质, 并分别进行主成分分析, 以期为鸡汤的原料选择及工业化生产提供理论依据。

1 材料与方 法

1.1 试验材料

1.1.1 试验原料与试剂

青脚麻鸡: 公母各 3 只, 90 日龄, 重量约 2.0 kg, 四川省内江金鑫畜禽有限公司;

2-甲基-3-庚酮: 分析纯, 美国 Sigma 公司;

氯化钠: 分析纯, 成都市科龙化工试剂厂。

1.1.2 主要仪器与设备

气相色谱—质谱联用仪: GCMS-QP2010 型, 日本岛津

基金项目: 公益性行业 (农业) 科研专项 (编号: 201303082-7)

作者简介: 张艳, 女, 西南大学在读硕士研究生。

通讯作者: 夏杨毅 (1970—), 男, 西南大学副教授, 博士, 硕士生导师。

E-mail: 265835528@qq.com

收稿日期: 2016—03—04

公司;

色谱柱:DB-5MS型,安捷伦科技有限公司;

固相微萃取器:75 μm CAR/PDMS 涂层萃取头,美国 Supelco 公司;

电子天平:FA2004B型,上海越平科学仪器有限公司;

数显恒温水浴锅:HH-S6型,常州普天仪器制造有限公司;

超低温冷冻储存箱:DW-FW110型,中科美菱低温科技有限公司。

1.2 试验方法

1.2.1 样品制备

(1) 肉鸡宰杀:屠宰后去除头、尾、内脏,其余部分薄膜包裹后置于 $-23\text{ }^{\circ}\text{C}$ 冻结,然后用内置冰块的保温箱运回实验室,于 $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ 冰柜贮藏备用。

(2) 鸡汤熬制:鸡肉解冻后清洗,切成 $3\text{ cm}\times 3\text{ cm}$ 的肉块,沸水预煮 3 min ,加水(料液比 $1:2$, g/mL)后大火煮沸,转小火熬制 3 h ,分别制备母鸡肉汤和公鸡肉汤。

1.2.2 鸡汤挥发性物质固相萃取 分别取样品 5 mL 装入 15 mL 萃取瓶中,加入风味内标物2-甲基-3-庚酮,旋紧瓶盖, $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 水浴平衡 15 min 后,再通过隔热垫插入活化好的SPME萃取头,并推出纤维头,置于 $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 恒温水浴锅中萃取 30 min ,立即插入GC-MS进样口 5 min 。

1.2.3 鸡汤挥发性物质 GC-MS 测定

(1) GC 条件:DB-5 MS 毛细管色谱柱($30\text{ m}\times 0.25\text{ mm}$, 0.25 mm);压力 106.6 kPa ;总流量 14.4 mL/min ;柱流量 1.90 mL/min ;载气为氦气,分流比 $5:0$;进样口温度 $250\text{ }^{\circ}\text{C}$,柱箱升温程序:起始温度 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$,以 $12\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 升至 $200\text{ }^{\circ}\text{C}$,保持 2 min ,再以 $6\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 升至 $250\text{ }^{\circ}\text{C}$,保持 4 min 。

(2) MS 条件:电子电离源;电子能量 70 eV ;接口温度 $230\text{ }^{\circ}\text{C}$;离子源温度 $230\text{ }^{\circ}\text{C}$;检测器电压 350 V ;质量扫描范围(m/z) $40\sim 350$ 。

1.2.4 鸡汤挥发性物质分析

(1) 定性方法:根据计算机谱库(NIST05、NIST05s)进行化合物的质谱鉴定,检测出挥发性成分匹配度大于 85 的化合物。

(2) 定量方法:样品在顶空固相萃取前加入 $1\text{ }\mu\text{L}$ 0.816 mg/mL 风味内标物2-甲基-3-庚酮,通过计算待检测挥发物的峰面积与内标物的峰面积之比求得浓度^[12]。

1.3 数据统计分析

采用 Microsoft excel 和 SPSS 17.0 分析数据,3 次重复试验,结果以均值士标准差表示,并进行主成分分析。

2 结果与分析

2.1 母鸡肉汤和公鸡肉汤的 GC-MS 总离子流图

由图 1、2 可知,整个 GC-MS 分析过程维持在 30 min ,相对含量较大的峰主要在前 15 min 。2-甲基-3-庚酮在 5.479 min 出峰,其余成分相对含量较小且分离程度良好。

2.2 母鸡肉汤和公鸡肉汤的挥发性物质种类和含量

由表 1、2 可知,两种鸡汤共检测出挥发性物质 78 种,其

图 1 母鸡肉汤的 GC-MS 总离子流图

Figure 1 Total ion chromatogram of volatile compounds in hen broth

图 2 公鸡肉汤的 GC-MS 总离子流图

Figure 2 Total ion chromatogram of volatile compounds in rooster broth

中母鸡肉汤和公鸡肉汤的挥发性风味物质种类分别为 $76, 67$ 种,含量分别为 $1\ 369.84, 1\ 029.61\ \mu\text{g}/100\text{ mL}$,主要有醛类、酮类、醇类、碳氢类、酸类、酯类等,其中反式-2-己烯醛、(*E, E*)-2,4-庚二烯醛、十三醛、2-庚酮、正己醇、(*Z, Z*)-8,10-十四双烯-1-醇、1-癸炔、2-甲基-3-乙基-1,3-己二烯、2-甲基十六烷、3-甲基-5-丙基壬烷、十五酸、丁位癸内酯、15-甲基十六碳酸甲酯共 13 种风味物质的含量差异显著($P < 0.05$)。仅在母鸡肉汤中检测出反式-2-己烯醛、(*E, E*)-2,4-十二碳二烯醛、2-庚酮、正己醇、(*Z, Z*)-8,10-十四双烯-1-醇、1-癸炔、丁位癸内酯、亚硫酸基、丁基十七烷基酯、15-甲基十六碳酸甲酯、邻苯二甲酸二异丁酯、癸醚共 11 种挥发性物质,仅在公鸡肉汤中检测出庚醇和3,5-二叔丁基苯酚 2 种挥发性物质,鸡汤的共有挥发性物质 65 种。

2.3 母鸡肉汤和公鸡肉汤的挥发性物质主成分分析

由表 3 可知,母鸡肉汤和公鸡肉汤的挥发性物质主成分有两种,且累积贡献率达到 100 。结合表 1 的载荷矩阵。母鸡肉汤的第一主成分有癸醛、(*Z*)-2-癸烯醛、2-癸酮、2-丁基-1-辛醇、十二醇、十五酸、3-甲基十七烷、十二酸、甲氧基苯基肟,第二主成分包括 γ -壬内酯、8-己基十五烷、3-甲基十四烷、十五烷、2,6,10-三甲基十二烷、6-甲基十三烷、二十二烷;公鸡肉汤的第一主成分有庚醛、十四醛、2-壬酮、2,3-辛二酮、1-辛烯-3-醇、庚醇、2,6,10-三甲基十二烷、3,7-二甲基十一烷、2,6,10,14-四甲基十六烷、6-甲基十三烷,第二主成分包括(*E, E*)-2,4-庚二烯醛、十八醛、2-十一碳烯醛。

母鸡肉汤和公鸡肉汤的醛类化合物含量最高,分别为 1 052.36,722.34 $\mu\text{g}/100 \text{ mL}$,占挥发性物质总量的 76.82%,70.16%。其中,母鸡肉汤的(*E,E*)-2,4-庚二烯醛含量显著高于公鸡肉汤($P<0.05$),反式-2-己烯醛、(*E,E*)-2,4-十二碳二烯醛仅在母鸡肉汤中检出。癸醛和庚醛、十四醛、十八醛可赋予肉汤水果香、甜香和脂香^[13-14],但气味特征不尽相

同,如癸醛具有甜香、蜡香、花香和橘香;庚醛具有鱼腥,坚果香,甜杏气息;十八醛主要为脂肪香味。一般低级醛类物质具有刺激性气味, C_8 以上高级醛呈水果香味, C_{13} 以上的长链醛类物质阈值较高、对食品风味贡献较低^[15]。母鸡肉汤的醛类含量和种类均高于公鸡肉汤,是影响不同性别肉鸡汤风味差异的重要原因。

表 1 两种鸡肉汤挥发性物质组成和主成分载荷矩阵[†]

Table 1 The main volatile components and principal component loading matrix of two chicken soup

种类	保留时间/min	化合物	含量/($10^{-2} \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$)		P	母鸡肉汤		公鸡肉汤	
			母鸡肉汤	公鸡肉汤		主成分 1	主成分 2	主成分 1	主成分 2
醛类	3.336	己醛	428.71±6.16	334.43±11.01	0.302	-0.795	-0.607	-0.375	-0.927
	4.103	反式-2-己烯醛	43.11±3.74 *	—	0.023	-0.745	-0.667	—	—
	4.874	庚醛	58.84±2.32	37.19±3.83	0.469	0.319	0.948	0.975	-0.223
	5.884	(<i>Z</i>)-2-庚烯醛	126.45±5.95	61.72±1.90	0.065	0.597	0.802	0.521	0.853
	6.766	辛醛	21.86±2.68	36.48±3.37	0.574	0.918	-0.396	0.875	-0.484
	6.925	(<i>E,E</i>)-2,4-庚二烯醛	6.21±0.38 *	1.32±0.20	0.038	-0.288	0.958	0.212	0.977
	7.853	反-2-辛烯醛	51.38±1.09	41.55±0.69	0.306	-0.998	0.065	-0.299	-0.954
	8.765	壬醛	117.38±2.29	74.70±1.99	0.762	-0.603	0.798	0.439	0.898
	9.848	反式-2-壬烯醛	31.64±2.09	20.31±1.32	0.291	-0.997	0.074	0.606	-0.796
	10.526	(<i>E,E</i>)-2,4-十二碳二烯醛	3.54±0.49	—	0.050	-0.984	-0.180	—	—
	10.736	癸醛	9.43±0.07	6.64±0.19	0.082	0.998	0.069	0.861	-0.509
	10.934	(<i>E,E</i>)-2,4-壬二烯醛	12.42±0.69	6.12±0.45	0.420	-0.813	-0.582	0.429	0.903
	11.804	(<i>Z</i>)-2-癸烯醛	43.96±3.59	36.92±2.59	0.421	0.996	-0.094	0.930	-0.368
	12.402	反式-2,4-癸二烯醛	16.94±3.54	5.76±0.90	0.127	0.308	0.951	-0.447	0.894
	12.627	十一醛	3.52±0.11	2.79±0.12	1.000	-0.607	0.795	0.398	-0.918
	12.835	2,4-癸二烯醛	20.21±1.34	18.46±1.16	0.649	-0.738	-0.675	-0.998	0.057
	13.644	2-十一碳烯醛	26.17±1.66	16.72±0.66	0.106	0.525	0.851	-0.144	0.990
	13.924	顺-4-庚烯醛	9.45±0.32	6.72±0.34	0.919	0.884	-0.467	-0.998	-0.064
14.425	十二醛	5.90±0.05	3.94±0.55	0.073	-0.901	0.434	0.547	-0.837	
16.126	十三醛	1.10±0.34 *	1.51±0.06	0.037	-0.469	0.883	0.057	-0.998	
20.785	十四醛	13.14±1.00	8.39±0.35	0.093	-0.953	0.304	0.999	0.043	
24.945	十八醛	1.00±0.06	0.66±0.01	0.093	0.884	-0.467	-0.217	0.976	
酮类	4.625	2-庚酮	2.37±0.12 *	—	0.034	0.410	0.912	—	—
	6.384	2,3-辛二酮	11.46±0.29	13.34±0.48	0.330	-0.999	0.033	0.980	0.197
	8.475	2-壬酮	2.54±0.06	2.37±0.06	1.000	-0.988	0.152	0.984	-0.178
	10.448	2-癸酮	1.49±0.26	1.25±0.12	0.282	0.977	0.215	-0.970	-0.243
	15.068	6,10-二甲基-5,9-十一双烯-2-酮	1.95±0.05	1.84±0.06	0.781	0.626	0.780	-0.484	0.875
	4.298	正己醇	2.48±0.04 *	—	0.021	0.236	-0.972	—	—
醇类	6.105	庚醇	—	0.81±0.02	0.116	—	—	0.993	-0.114
	6.312	1-辛烯-3-醇	23.62±0.40	18.33±1.82	0.207	-0.999	-0.035	0.994	-0.106
	7.431	3,5-辛二烯-2-醇	3.78±0.21	2.55±0.40	0.468	-0.949	0.316	-0.996	0.093
	8.556	(4 <i>E</i>)-2-甲基-4-己烯-3-醇	3.86±0.13	2.78±0.14	0.911	0.711	0.703	-0.781	0.625
	15.517	十二醇	15.50±1.10	19.18±0.74	0.405	0.997	0.072	-0.994	0.111
	17.617	2-丁基-1-辛醇	1.53±0.07	1.72±0.11	0.434	0.974	-0.226	-0.713	-0.701
	19.278	<i>E</i> -2-十四碳烯-1-醇	0.92±0.07	2.48±0.16	0.174	0.517	0.856	-0.273	-0.962
22.642	(<i>Z,Z</i>)-8,10-十四双烯-1-醇	0.50±0.05 *	—	0.036	0.913	-0.408	—	—	

续表1

种类	保留时间/min	化合物	含量/(10 ⁻² μg·mL ⁻¹)		P	母鸡肉汤		公鸡肉汤	
			母鸡肉汤	公鸡肉汤		主成分1	主成分2	主成分1	主成分2
	7.117	1-癸炔	3.88±0.47*	—	0.049	0.644	-0.765	—	—
	7.323	2-甲基-3-乙基-1,3-己二烯	4.72±0.63*	0.74±0.07	0.024	-0.399	0.917	-0.273	0.962
	14.251	十三烷	3.91±1.66	6.57±1.28	0.680	-0.847	0.532	0.973	-0.230
	15.932	十五烷	6.64±2.82	9.29±0.51	0.053	-0.161	0.987	0.946	0.324
	16.658	2,6,10-三甲基十二烷	0.97±0.13	2.82±0.70	0.215	-0.184	0.983	0.999	0.051
	16.754	3,7-二甲基十一烷	1.20±0.11	2.64±0.59	0.190	-0.311	0.950	0.998	-0.066
	17.064	3-甲基十四烷	10.07±2.75	12.97±2.23	0.606	-0.157	0.988	0.510	0.860
	17.527	十六烷	11.37±0.95	4.22±0.20	0.186	-0.128	-0.992	0.954	-0.300
	18.232	6-甲基十三烷	1.42±0.07	0.81±0.13	0.468	0.190	0.982	0.991	-0.136
碳 氢 类	18.301	2,6,10-三甲基十四烷	2.23±1.94	2.12±1.20	0.279	-0.282	0.959	0.854	0.520
	18.400	8-己基十五烷	1.59±0.36	4.60±0.82	0.171	0.152	0.988	0.921	-0.389
	18.493	2-甲基十六烷	1.83±1.42*	1.47±0.23	0.034	-0.269	0.963	0.893	-0.450
	18.603	2,6,10,14-四甲基十七烷	35.51±5.00	12.63±1.13	0.170	0.953	0.304	-0.242	0.970
	19.036	十七烷	6.21±0.74	1.27±0.18	0.185	0.742	-0.671	0.672	-0.741
	19.655	3-甲基-5-丙基壬烷	1.83±0.47*	0.35±0.03	0.028	-0.484	-0.875	-0.290	0.957
	19.708	6-甲基-十一烷	2.05±0.09	0.65±0.02	0.072	0.803	0.595	-0.923	0.385
	19.951	十八烷	6.79±1.54	2.15±0.33	0.101	0.885	-0.466	0.173	-0.985
	20.063	3-甲基十七烷	2.12±0.69	0.60±0.11	0.087	0.982	0.188	0.950	0.313
	20.501	十九烷	14.36±2.10	4.13±0.38	0.134	0.833	-0.554	-0.526	0.850
	20.597	2,6,10,14-四甲基十六烷	9.16±0.21	3.60±0.26	0.965	-0.467	0.884	0.992	-0.126
	22.241	二十二烷	1.82±0.57	1.60±0.35	0.289	-0.221	0.975	0.828	0.561
	2.829	乙酸	1.66±0.30	3.49±0.28	0.885	0.597	-0.802	0.822	0.569
	10.058	辛酸	4.57±0.42	20.82±0.64	0.326	-0.978	0.211	-0.029	-1.000
	13.533	癸酸	2.20±0.12	5.29±0.24	0.167	-0.914	-0.407	0.803	-0.596
	16.816	十二酸	2.09±0.30	12.40±0.36	0.683	0.979	0.205	-0.176	0.984
酸 类	19.839	十四酸	20.78±0.75	22.98±1.42	0.345	-0.79	-0.613	-0.999	-0.038
	21.409	十五酸	1.16±0.18*	1.06±0.04	0.045	0.988	-0.152	-0.918	-0.398
	22.969	顺式-9-十六碳烯酸	16.95±0.36	3.41±0.24	0.576	0.716	-0.698	-0.645	0.764
	23.458	十六酸	22.33±1.20	70.06±1.19	0.905	-0.615	0.789	-0.463	0.886
	26.988	顺式-十八碳烯酸	2.77±0.07	9.64±0.22	0.093	0.559	-0.829	-0.910	0.415
		11.136	亚硫酸基,环己基甲基十三烷基酯	3.73±0.15	1.37±0.17	0.852	0.835	-0.551	0.698
	13.571	γ-壬内酯	4.60±0.32	1.78±0.24	0.557	-0.149	0.989	-0.816	-0.579
	15.841	δ-癸内酯	0.96±0.04*	—	0.016	0.626	0.780	—	—
酯 类	19.508	亚硫酸基,丁基十七烷基酯	0.84±0.03	—	0.050	0.037	-0.999	—	—
	20.867	十四酸异丙酯	3.47±0.07	1.48±0.10	0.599	0.932	0.362	-0.548	-0.836
	21.495	邻苯二甲酸二异丁酯	0.47±0.02	—	0.071	0.703	-0.711	—	—
	22.742	15-甲基十六碳酸甲酯	0.54±0.04*	—	0.021	-0.517	-0.856	—	—
酚类	16.021	3,5-二叔丁基苯酚	—	0.45±0.04	0.116	—	—	-0.596	-0.803
醚类	18.952	癸醚	7.54±0.08	—	0.099	0.803	-0.596	—	—
其 它	5.082	甲氧基苯基-脲	4.58±0.35	1.43±0.16	0.133	1.000	-0.025	-0.806	-0.592
	6.504	2-正戊基咪喃	13.16±0.13	4.21±0.21	0.393	-0.083	-0.997	0.731	0.683
	12.277	1-甲氧基-4-[(Z)-1-丙烯基]苯	1.52±0.35	5.51±0.32	0.910	-0.986	-0.164	-0.951	-0.310

† —表示未检测出; *表示差异显著(P<0.05)。

表 2 两种鸡肉汤挥发性物质种类和含量的比较

Table 2 Comparison of contents and varieties of volatile flavor compounds identified in two chicken soup

化合物	母鸡肉汤		公鸡肉汤	
	种类	含量/ ($10^{-2}\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)	种类	含量/ ($10^{-2}\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)
醛类	22	1 052.36	20	722.34
酮类	5	19.81	4	18.80
醇类	8	52.19	7	47.85
碳氢类	21	129.59	20	75.24
酸类	9	74.50	9	149.16
酯类	7	14.60	3	4.63
其它	4	26.80	4	11.59
总计	76	1 369.84	67	1 029.61

表 3 主成分特征值和贡献率

Table 3 Eigenvalues and contribution rates of principal components

肉汤	主成分	特征值	贡献率/%	累积贡献率/%
母鸡	1	41.601	54.738	54.738
	2	34.399	45.262	100.000
公鸡	1	38.215	57.038	57.038
	2	28.785	42.962	100.000

母鸡肉汤和公鸡肉汤分别检测出 5 种和 4 种酮类,呈水果香味的 2-庚酮仅在母鸡肉汤中检出。2-壬酮、2,3-辛二酮对公鸡肉汤的总体风味贡献较大,可分别赋予鸡汤甜香和奶香香味^[16]。酮类化合物是脂肪氧化的产物,含量较低,阈值较高,多数具有奶香和甜香,有些还是形成杂环化合物的重要中间体,对香气形成有不可忽视的作用^[17]。

母鸡肉汤和公鸡肉汤均检测到 9 种醇类物质,但正己醇和(Z,Z)-8,10-十四双烯-1-醇仅在母鸡肉汤中检出。正己醇呈现青草气息的水果味,可在脂肪氧化酶的作用下转化为正己醛^[18]; (Z,Z)-8,10-十四双烯-1-醇阈值相对较低,对风味贡献大。公鸡肉汤和母鸡肉汤的不饱和醇含量分别为 27.86,32.68 $\mu\text{g}/100\text{ mL}$,其中 1-辛烯-3-醇在公鸡肉汤中的含量相对较高,且第一主成分中的载荷值为 0.994,是不饱和脂肪酸的氧化产物^[19],具有蘑菇香气药草香韵。

母鸡肉汤和公鸡肉汤的碳氢化合物总量分别为 129.59,75.24 $\mu\text{g}/100\text{ mL}$,载荷值较高,但对风味直接贡献小,对整体风味的提高有重要作用^[20]。母鸡肉汤的 2-甲基-3-乙基-1,3-己二烯、2-甲基十六烷、3-甲基-5-丙基壬烷含量显著高于公鸡肉汤($P<0.05$),表明碳氢化合物对公鸡肉汤和母鸡肉汤的风味贡献有所不同^[21]。

母鸡肉汤和公鸡肉汤中均检测到酸类物质 9 种,且无种类差异,但公鸡肉汤的酸类化合物含量是母鸡肉汤的 2 倍,

但由于酸类物质的挥发性较小,对鸡汤香气贡献不大。

母鸡肉汤中检测出酯类 7 种、含量为 14.6 $\mu\text{g}/100\text{ mL}$,除 γ -壬内酯、 δ -癸内酯外,皆为含有大于 C_{10} 的长链脂肪酸的酯类;公鸡肉汤中只检测出 γ -壬内酯、十四酸异丙酯、亚硫酸基,环己基甲基十三烷基酯,总含量为 4.63 $\mu\text{g}/100\text{ mL}$ 。酯类是由游离脂肪酸和脂肪氧化所产生的醇之间相互作用而产生,对肉汤风味影响较大;含有 $\text{C}_1\sim\text{C}_{10}$ 脂肪酸的酯类一般具有水果味,含有大于 C_{10} 的长链脂肪酸的酯类一般具有脂肪风味^[22],酯类物质在高温氧化过程中能够生成大量的 2,4-癸二烯醛^[23]。

母鸡肉汤的 2-正戊基呋喃含量为公鸡肉汤的 3 倍,是亚油酸分解后所得产物^[24],具有蔬菜芳香气^[25],对鸡汤的整体风味有很大影响,表明公鸡肉汤和母鸡肉汤风味有所不同。

3 结论

两种鸡汤共检测出挥发性物质 78 种,母鸡肉汤和公鸡肉汤的挥发性物质种类分别为 76,67 种,含量分别为 1 369.84,1 029.61 $\mu\text{g}/100\text{ mL}$,主要为醛类、酮类、醇类、烷烃类、酸类和酯类,两者共同含有的挥发性物质为 65 种。母鸡肉汤和公鸡肉汤中反式-2-己烯醛、(E,E)-2,4-庚二烯醛、十三醛、2-庚酮、正己醇等 13 种风味物质的含量差异显著($P<0.05$)。母鸡肉汤和公鸡肉汤的挥发性物质有两种主成分,且累计贡献率为 100%,但挥发性物质的种类和含量差别较大。对母鸡肉汤总体风味贡献较大的物质有癸醛、反式-2-己烯醛、(E,E)-2,4-十二碳二烯醛、(Z)-2-癸烯醛、2-庚酮、正己醇、(Z,Z)-8,10-十四双烯-1-醇、2-丁基-1-辛醇、十二醇、 δ -癸内酯、15-甲基十六碳酸甲酯、 γ -壬内酯、甲氧基苯基-肟、3-甲基十七烷、8-己基十五烷、3-甲基十四烷、十五烷、2,6,10-三甲基十二烷、6-甲基十三烷;对公鸡肉汤总体风味贡献较大的物质有庚醛、(E,E)-2,4-庚二烯醛、2-十一碳烯醛、2-壬酮、2,3-辛二酮、1-辛烯-3-醇、庚醇、2,6,10-三甲基十二烷、3,7-二甲基十一烷、2,6,10,14-四甲基十六烷、6-甲基十三烷。另外,有一些挥发性物质为某种鸡汤所特有或在两种鸡汤中差异显著,但呈味特点尚不清楚,需要进一步的研究。

参考文献

- [1] SUN Ling-xia, CHEN Jin-ping, LI Miao-yun, et al. Effect of star anise (*illicium verum*) on the volatile compounds of stewed chicken[J]. Journal of Food Process Engineering, 2014, 37(2): 131-145.
- [2] GADEKAR Y P, ANJANEYULU A S R, THOMAS R, et al. Quality changes in soup from deboned chicken frames at refrigerated ($4\text{+}/-1\text{ degrees C}$) and frozen ($-18\text{+}/-1\text{ degrees C}$) storage[J]. International Journal of Food Science, 2009, 44(9): 1 763-1 769.
- [3] 刘建彬, 康乐, 刘梦娅, 等. 鸡肉肽在美拉德反应中对生成肉味化合物的贡献研究[J]. 现代食品科技, 2015, 31(4): 301-310.
- [4] 王瑞花, 姜万舟, 汪倩, 等. 烹制方法对猪肉脂质氧化和挥发性

- 风味物质的作用研究[J]. 现代食品科技, 2016, 32(1): 175-182, 312.
- [5] ALMELA E, JOSE Jordan M, MARTINEZ C, et al. Ewe's diet (pasture vs grain-based feed) affects volatile profile of cooked meat from light lamb[J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2010, 58(17): 9 641-9 646.
- [6] 习耀, 王婵. 加热方式对鸡汤风味品质影响的研究[J]. *食品科技*, 2013, 38(10): 77-82.
- [7] 陈建良, 芮汉明, 陈号川. 不同鸡种的鸡肉挥发性风味特性的比较研究[J]. *现代食品科技*, 2009, 25(10): 1 129-1 134.
- [8] DASHDORJ D, AMNA T, HWANG I. Influence of specific taste-active components on meat flavor as affected by intrinsic and extrinsic factors: an overview[J]. *European Food Research and Technology*, 2015, 241(2): 157-171.
- [9] 陈康, 李洪军, 贺雅非, 等. 不同性别伊拉兔肉挥发性风味物质的 SPME—GC—MS 分析[J]. *食品科学*, 2014, 35(6): 98-102.
- [10] GORRIAZ C, BERIAIN M J, CHASCO J, et al. Effect of aging time on volatile compounds, odor, and flavor of cooked beef from pirenaica and Friesian bulls and heifers[J]. *Journal of Food Science*, 2001, 67(3): 916-922.
- [11] 袁华根. 鸡肉汤香味成分鉴定及日龄、性别和胴体部位对鸡肉风味的影响[D]. 南京: 南京农业大学, 2007: 55-62.
- [12] GU Sai-qi, WANG Xi-chang, TAO Ning-ping, et al. Characterization of volatile compounds in different edible parts of steamed Chinese mitten crab (*Eriocheir sinensis*)[J]. *Food Research International*, 2013, 54(1): 81-92.
- [13] 朱建军, 王晓宇, 胡萍, 等. 黔式腊肉加工过程中挥发性风味物质的变化[J]. *食品与机械*, 2013, 29(4): 20-23.
- [14] MACHIELS D, ISTASSE I, VAN Ruth S M. Gas chromatography-olfactometry analysis of beef meat originating from differently fed Belgian Blue, Limousin and Aberdeen Angus bulls[J]. *Food Chemistry*, 2004, 86(3): 377-383.
- [15] VARLET V, PROST C, SEROT T. Volatile aldehydes in smoked fish: analysis methods occurrence and mechanisms of formation[J]. *Food Chemistry*, 2007, 105(4): 636-656.
- [16] 唐道邦, 黄彬, 黄金枝, 等. 不同卤制工艺对盐水鸡肉风味物质含量的影响[J]. *中国调味品*, 2015(7): 37-42.
- [17] 孙承锋, 喻倩倩, 宋长坤, 等. 酱牛肉加工过程中挥发性成分的含量变化分析[J]. *现代食品科技*, 2014, 30(3): 130-136.
- [18] 朱静, 师俊玲, 刘延琳, 等. 苹果中正己醇转化酶的提取及其特性研究[J]. *中国食品学报*, 2010, 10(4): 73-80.
- [19] PURRINOS L, BERMUDEZ R, FRANCO D, et al. Development of volatile compounds during the manufacture of dry-cured "Lacón" a spanish traditional meat product[J]. *Journal of Food Science*, 2011, 76(1): C89-C97.
- [20] SÁNCHEZ-Peña C M, LUNA G, GARCÍA-González D L, et al. Characterization of French and Spanish dry-cured hams: influence of the volatiles from the muscles and the subcutaneous fat quantified by SPME—GC[J]. *Meat Science*, 2005, 69(4): 635-645.
- [21] YU Xiu-zhu, YANG Chen, DU Shuang-kui, et al. A new method for determining free fatty acid content in edible oils by using electrical conductivity[J]. *Food Analytical Methods*, 2012, 5(6): 1 453-1 458.
- [22] 蒲丹丹, 孙杰, 陈海涛, 等. SDE—GC—MS 结合 GC—O 对比熟湖南腊肉和熟广东腊肉的挥发性风味成分[J]. *食品科学*, 2015, 36(24): 131-136.
- [23] 赵琴, 张立彦, 曾清清. 不同熬煮方法对鸡骨汤风味物质的影响[J]. *食品工业科技*, 2015, 36(7): 314-319.
- [24] ELMORE J S, COOPER S L, ENSER M, et al. Dietary manipulation of fatty acid composition in lamb meat and its effect on the volatile aroma compounds of grilled lamb[J]. *Meat Science*, 2005, 69(2): 233-242.
- [25] LGOR J, JOSIP M, SNJEZANA T. A study of volatile flavour substances in Dalmatian traditional smoked ham: Impact of dry-curing and frying[J]. *Food Chemistry*, 2007, 104(3): 1 030-1 039.

(上接第 13 页)

- [7] 林向阳, 彭树美, 张宏, 等. 豆粕双螺杆湿法挤压组织化工艺优化[J]. *中国农学通报*, 2011, 27(26): 129-136.
- [8] 刘克顺, 周瑞宝, 田少君, 等. 纤维状仿肉制品的高湿挤压生产技术[J]. *中国油脂*, 2006, 31(3): 49-51.
- [9] 贾君. 单双螺杆挤压组织化大豆蛋白的工艺研究[J]. *食品与机械*, 2003(6): 19-21.
- [10] AKDOGAN H. Pressure, torque, energy responses of a twin screw extruder at high moisture contents[J]. *Food Research International*, 1996, 29: 423-429.
- [11] LIN S, HUFF H E, HSIEH F. Extrusion process parameters, sensory characteristics, and structural properties of a high moisture soy protein meat analog[J]. *Journal of Food Science*, 2002, 67(3): 1 066-1 072.
- [12] 郎珊珊, 闫树田, 石戴卫. 结构参数对挤压组织化花生蛋白质构特性影响[J]. *食品与机械*, 2014, 30(4): 113-115.
- [13] 康立宁, 魏益民, 张波, 等. 大豆蛋白高水分挤压组织化过程中操作参数对单位机械能耗的影响[J]. *中国粮油学报*, 2007, 22(3): 38-42.
- [14] 王洪武, 马榴强, 周建国, 等. 大豆蛋白原料体系对挤压组织化的影响[J]. *中国食品学报*, 2002, 2(1): 33-38.
- [15] MARTELLI F G. Twin-screw extruders: a basic understanding [M]. New York: Van Nostr and Reinhold, 1983: 110-118.
- [16] MEUSER F, LENGERICH B V, RERMERS H. Extrusion cooking of starches, comparison of experimental results derived from laboratory and full scale extruders by means of system analysis[J]. *Starch/Staerke*, 1984, 36(6): 194-199.
- [17] JIN Z, HSIEH F, HUFF H E. Extrusion cooking of corn meal with soy fiber, salt, and sugar[J]. *Cereal Chem.*, 1994, 71(3): 227-234.